



Lubristil[®] MULTIDOSIS

Solución oftálmica lubricante
HIALURONATO SÓDICO 0,2%

Envase de 10ml
SIN CONSERVANTES
SIN FOSFATOS



Composición:

Hialuronato sódico (0,2% p/v), cloruro sódico, citrato sódico, ácido cítrico monohidratado, agua para preparaciones inyectables.

¿Qué es?

Lubristil multidosis es una solución oftálmica lubricante estéril, sin conservantes ni fosfatos, de hialuronato sódico.

¿Cómo se presenta?

Lubristil multidosis se presenta como una solución oftálmica lubricante en un envase de 10 ml sin conservantes.

¿Cuándo debería usarse?

Lubristil multidosis es una solución oftálmica con hialuronato sódico de alto peso molecular, obtenido por síntesis biotecnológica.


El hialuronato sódico es una sustancia que origina soluciones mucomiméticas. La viscosidad de estas soluciones proporciona unas propiedades lubricantes óptimas que generan un efecto hidratante y estabilización de la película lagrimal.

Las propiedades lubricantes, hidratantes y protectoras del hialuronato sódico alivian la irritación, la sequedad, la quemazón y la sensación de cuerpo extraño debidas a elementos medioambientales (viento, sol, humo, aire seco), estrés visual (luz excesiva y uso prolongado de ordenadores) o factores mecánicos (uso de lentes de contacto o después de una intervención de cirugía ocular), proporcionando un alivio duradero.

Lubristil multidosis no contiene conservantes ni fosfatos y es adecuado para su uso con lentes de contacto.

¿Cuánto debería usar?

La dosis habitual es de 1 gota en el ojo afectado una o más veces al día, según sea necesario.



Precauciones y advertencias:

- No usar si el envase está dañado.
- Producto exclusivo para uso oftálmico externo.
- No usar si es alérgico a cualquiera de los componentes.
- No usar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- No tocar el ojo con el aplicador del envase.
- En raras ocasiones, después de la administración puede experimentarse temporalmente una ligera visión borrosa, debida a la viscosidad de la solución. Por ello, es aconsejable esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera claridad visual.
- Dejar transcurrir 10-15 minutos después de aplicar Lubristil multidosis antes de administrar medicamentos oftálmicos externos.
- Una vez abierto el envase, puede utilizarlo durante los siguientes 90 días.
- Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Conservar por debajo de 25°C.
- No ingerir.
- Para evitar el riesgo de que se obture el envase, no extraer más de 30 gotas seguidas.
- Cierre cuidadosamente el envase tras cada uso, asegurándose de que la punta del aplicador no tiene gotas residuales. Si tiene, elimínelas con un movimiento seco de muñeca.

Farmigea S.p.A.
Vía G.B. Oliva 6/8,
56121 Pisa, Italia

Comercializado por:
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
C. Osi, 7, 08034 Barcelona - España

Fecha de la última revisión del texto: Mayo 2016



Desechar de forma adecuada después de su uso.

CE 0546

STERILE A

ANGELINI

AF-P/00